

## **INTERMITOX® PUDER | INTERMITOX® SPRÜHKONZENTRAT**

Die bewährte Ektoparasiten- und Milbenbekämpfungsmittel für Stallflächen

- Wirken zuverlässig, schnell und anhaltend (Depotwirkung).
- Auch im belegten Stall [bei sachgemäßer Anwendung] einsetzbar.
- 1 Liter des flüssigen Konzentrat reicht bis zu 1000 m<sup>2</sup>
- 1 kg des Puders reicht für ca. 100 m<sup>2</sup>.

### **Anwendungsbereiche:**

INTERMITOX® und INTERMITOX® PUDER sind geeignet für Flächen aller Art z.B. in

- Geflügel- und Putenställen sowie Taubenschlägen.
- Schweine-, Rinder-, Pferde-, Schaf- und Ziegenställen sowie für
- Zwinger und Körbchen ect. für Hunde und Katzen [INTERMITOX® PUDER].

Die Bekämpfung von Ektoparasiten durch INTERMITOX® oder INTERMITOX® PUDER hilft mit, die Übertragung von Krankheiten in Tierbeständen, Stress und schlechte Futtermittelverwertung zu verhindern.

### **Anwendungsmethode und Dosierung:**

INTERMITOX® SPRÜHKONZENTRAT ZUR SOFORTWIRKUNG GEGEN MILBEN Gebrauchslösung anmischen.

INTERMITOX® Wasser Gebrauchslösung  
100 ml            10 Liter 1,0 %

10 Liter Gebrauchslösung reichen für ca. 100 m<sup>2</sup>

Stall und Stalleinrichtung mit 1 %igen Gebrauchslösung besprühen. Insbesondere Spalten, Ritzen, und Stangen behandeln, da sich dort die Parasiten besonders gern aufhalten.

In belegten Ställen: INTERMITOX® möglichst abends ausbringen. Gegeben falls ein- bis zweimal nach jeweils 7 Tagen die Behandlung wiederholen, um die Neuablage von Milbeneiern zu verhindern.

In leeren Ställen: Die erste Behandlung sollte sofort nach dem Ausstallen erfolgen. Bei starkem Befall nochmals einen Tag vor der Einstallung sprühen.

INTERMITOX® PUDER ZUR LANGZEITBEKÄMPFUNG Stall und Stalleinrichtung, Kleintierkäfige, Boxen, Zwinger, Körbchen und Decken mit INTERMITOX® PUDER einstäuben. INTERMITOX® PUDER verklebt nicht auf den Flächen, sondern wirkt wochenlang an wechselnden Stellen. 1 kg reicht für ca. 100 m<sup>2</sup>. Zur Dosierung empfehlen wir die InterHygiene Zerstäubegeräte. INTERKOKASK® LÖST AUCH MILBEN UND MILBENEIER im leeren Stall.

**Wirkung:**

INTERMITOX® SPRÜHKON -ZENTRAT und INTERMITOX® PUDER wirken zuverlässig, schnell und anhaltend (Depotwirkung) gegen Parasiten, wie z. B. rote Vogelmilbe, Räudemilben (z. B. Sarkoptesmilbe), Zecken, Federlin-ge, Haarlinge, Flöhe, Läuse usw.

INTERMITOX® SPRÜHKONZENTRAT

**Wirkstoffbasis:** 12 % Cypermethrin

**baua-Reg.-Nr.:** N-41123

**Lieferform:** 100 ml Flasche, 250 ml Flasche, 1000 ml Flasche.

**Gefahrenhinweise für das Konzentrat:** Symbole: Xn, N, R10 Entzündlich. R36 Reizt die Augen. R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen; kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

**INTERMITOX® PUDER Wirkstoffbasis:** 1 g enthält 10 mg Cypermethrin

**baua-Reg.-Nr.:** N-41124

**Lieferform:** 500 g Streudose, 1 kg Nachfüllbeutel, 25 kg Sack

**Gefahrenhinweise:** Piktogramme: entfällt | Signalwort: entfällt

ANWENDUNGSHILFEN FÜR INTERMITOX® PUDER: Großraum - Zerstäubegerät

**IHRE PRODUKTALTERNATIVEN GEGEN MILBEN:**

INTERMISTOP®, CBM 8® MV, RAMBOSAL® K, INTERFLYSTOP® KONZENTRAT

**Biozide sicher verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**